

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HEPATITEI

Find The **Missing** Millions.

28 iulie 2018

ELIMINAREA ~~HEPATITEI~~



HEPATITA VIRALĂ este o problemă de sănătate publică la nivel mondial

Hepatitele tip B și tip Cucid anual mai mulți oameni decât HIV/SIDA, malaria și tuberculoza

- Hepatitele B și C sunt responsabile pentru 2 din 3 decese cauzate de cancerul hepatic.
- >300 de milioane de oameni trăiesc fără să știe cu hepatita virală.
- Costul de 20 de cenți/vaccin la naștere încă nu este folosit în 48% din țările lumii.
- Eliminarea hepatitei B și hepatitei C, ca amenințări la adresa sănătății publice, până în anul 2030 ar preveni aproximativ 36 de milioane de infecții și ar salva 10 milioane de vieți.
- Din cele 325 de milioane de oameni care trăiesc cu hepatita virală la nivel global, mai mult de 300 de milioane (9 din 10!) trăiesc fără să știe cu hepatita B sau C. Fără îmbunătățirea semnificativă a diagnosticului, ratele de tratament vor scădea, ratele de infectare vor crește și vom pierde posibilitatea de a elimina hepatita virală până în anul 2030.¹

1. World Hepatitis Alliance (WHA): <http://worldhepatitisday.org/en/about-us>; <http://www.worldhepatitisalliance.org/world-hepatitis-day/campaign-materials>

HEPATITELE VIRALE în România

Hepatita virală tip A


- În anul 2016, s-au înregistrat 3212 cazuri de hepatită virală A, cu incidența la nivel național de 16,3‰₀₀₀ locuitori, cu 48,5% mai mică decât în anul 2015.
- Din cele 3212 cazuri, 55,04% au fost înregistrate la persoanele de sex masculin.⁵

Hepatitele virale tip B și tip C

- În anul 2017, în sistemul național de supraveghere au intrat 238 cazuri de hepatite virale tip B și C, cu 28% mai puține față de anul precedent (329).
- Continuă trendul descendent pentru incidența raportată a hepatitei virale tip B, în paralel cu variații minore, de la un an la altul, pentru hepatita virală tip C.
- În anul 2017 au intrat în sistemul național de supraveghere 135 cazuri nou depistate de hepatită virală tip B, din care 99% în stadiu acut și 1% în stadiu cronic.
- Hepatita virală acută tip B a fost mai frecvent raportată pentru grupa de vârstă 35-44 ani, la total și la sexul masculin.
- Calea de transmitere nosocomială a înregistrat frecvența cea mai ridicată, pentru ambele tipuri de hepatită acută, cu mențiuni de tratamente stomatologice în cazul hepatitei virale acute tip B și de tratamente injectabile în spital, în cazul hepatitei virale acute tip C.⁶

5. CNSCBT: <http://www.cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anuale/549-analiza-evolutiei-bolilor-transmisibile-afolate-in-supraveghere-raport-pentru-anul-2016>

6. CNSCBT: <http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/hepatita-virala-tip-b-si-c/913-hepatita-virala-tip-b-si-c-anul-2017-analiza>



HEPATITELE VIRALE la nivel european

Hepatita virală tip A

- Din ianuarie 2017 până în februarie 2018, 26 țări UE/SEE (Austria, Belgia, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxembourg, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, Slovenia, Spania, Suedia, Anglia, Ungaria, Islanda, Lituania și Polonia) au raportat 21230 cazuri confirmate cu laboratorul, cu raport pe sexe M/F de 3,3.
- Cele 20089 cazuri de hepatită A raportate de 26 țări în perioada ianuarie-decembrie 2017 reprezintă o creștere de aproape 4 ori comparativ cu media celor 5648 cazuri raportate pentru aceeași perioadă între anii 2012 și 2015. Din acestea, pentru 20067 cazuri există informații despre sexul pacientului: 15591 bărbați și 4476 femei.
- Comparativ cu numărul mediu de cazuri de hepatită A raportate în anii din perioada 2012-2015, numărul de cazuri la bărbați a crescut cu 413% și numărul de cazuri la femei a crescut cu 70%.²

Hepatitele virale tip B și tip C

- Potrivit estimărilor ECDC, prevalența hepatitei B în UE/SEE este în jur de 0,9%, iar pentru hepatita C, prevalența este de 1,1%.³
- În regiunea OMS Europa, se estimează că există 14 milioane de adulți infectați cronic cu hepatita B, 9 milioane infectați cronic cu hepatita C, cu prevalențe de 2-3 ori mai mari în țările non-UE.
- Se estimează că 1 din 50 de adulți este infectat cu VHB sau are infecție cronică cu VHC.⁴

2. ECDC: www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-hepatitis-outbreak-eueea-mostly-affecting-men-who-have-sex-men-1

3. ECDC: <https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-around-9-million-europeans-are-affected-chronic-hepatitis-b-or-c>

4. ECDC. Systematic review on hepatitis B and C prevalence in the EU/EEA; 2016: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/hepatitis_B/Pages/Annual-Epidemiological-Report-for-2015.aspx#sthash.kD96rMRw.dpuf



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ



CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A STĂRII DE SĂNĂTATE



CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘOARA